

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles ci-après. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions externes à l'Organisation exige l'approbation préalable de la Direction du CERN.

OFFICIAL NEWS

Members of the personnel shall be deemed to have taken note of the news under this heading. Reproduction of all or part of this information by persons or institutions external to the Organization requires the prior approval of the CERN management.

COMITE CONSULTATIF DU PERSONNEL SUPERIEUR

Résultat des élections

1. Le dépouillement des bulletins de vote a eu lieu le 11 juin 1987 en public, de 18.00 à 19.00 h, au 4^e étage du bâtiment 14 (Division EF). Les résultats sont les suivants :

Inscrits	551
Bulletins reçus	402
Bulletins invalides	1
Bulletins nuls	3
Bulletins blancs	1
Suffrages exprimés	397

2. Ont obtenu :

Groupe 2

Physiciens appliqués, ingénieurs, informaticiens

JACOBS David	165
GOEBEL Klaus	159
BLECHSCHMIDT Dieter	135
VON HOLTEY Georg	87
SCARAMELLI Alberto	81
FEYT Jean	56

Groupe 5

Administrateurs

DORAN Michael	203
LINDECKER Gilles	68
ESPINOSA Jose	29
BYRNE-SUTTON Geoffrey	15

3. Sont proclamés élus :

Groupe 2

JACOBS David
GOEBEL Klaus

Groupe 5

DORAN Michael


4. Toute réclamation est à formuler avant le 11 juillet 1987 auprès de Monsieur Ph. Bernard/EF, ou de Monsieur H. Lengeler/EF.

Fait au CERN, le 11 juin 1987, en présence de MM. N. Blackburne, G. Cavallari, L. di Lella, J. Gareyte, H. Haseroth, D. Jacobs, W. Middelkoop et D. Williams.

Philippe Bernard



Herbert Lengeler



SEMINARS SEMINAIRES

Wednesday 15 July

THEORETICAL SEMINAR

at 14.00 hrs – TH Conference Room

Supersymmetry breaking in superstring inspired models

by Mary-K. GAILLARD / University of California, Berkeley

Monday 20 July

EP SEMINAR

at 16.30 hrs – Auditorium

Jet measures and hadronic event shapes at the CERN antiproton-proton collider

by Valerio VERCESI / CERN

The UA2 experiment has performed a detailed study on the evolution of the hadronic energy flow as a function of the total transverse energy, using collective shape variables. The data, collected at the CERN antiproton-proton collider in the highly segmented central calorimeter of the UA2 detector, cover the range 10-210 GeV. A smooth transition between two different dynamical regimes is observed, one at low E_T characterized by P_T limited phase space and the other at high E_T dominated by QCD two-jet configurations. A study of the relative population of two- and three-jet systems will be presented.